




اداره کل اوقات و امور خیریه

بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم (ع)

هیپوسپادياس

هیپوسپادياس یک نقص مادرزادی است که در آن محل خروج ادرار، به طور نامناسب در زیر آلت تناسلی قرار گرفته است. پیشابراه (مجرای خروج) لوله ای است که ادرار را از مثانه به بیرون هدایت می کند. در آقایان انتهای پیشابراه باید دقیقاً در نوک آلت تناسلی باشد. این بیماری به صورت مادرزادی در هر ۴ نوزاد از هزار مورد تولد دیده می شود.



علائم بیماری هیپوسپادياس چیست؟

علائم این بیماری به شدت مشکل ایجاد شده بستگی دارد. در بسیاری از مواقع در پسرهای مبتلا به این بیماری، منفذ مجرای ادراری در نزدیکی نوک آلت و در زیر آن قرار دارد. در نوع شدیدتر این بیماری، ممکن است این منفذ در میان آلت تناسلی یا حتی در قاعده آن دیده شود. حتی ممکن است این منفذ در روی کیسه بیضه یا در زیر کیسه نیز دیده شود. یکی از علامت های این بیماری، خم شدن رو به پایین آلت تناسلی حین نعوظ (نعوظ در سنین پایین نیز در پسران شایع است)

دیگر علائم شامل:

- پاشیده شدن ادرار مانند اسپری به صورت غیر طبیعی
- قرمز شدن اطراف آلت تناسلی
- ناتوانی در ایستاده ادرار کردن



این مشکل چگونه توسط پزشک معالج تشخیص داده می شود؟

هیپوسپادياس معمولاً با معاینه پزشک بلافاصله پس از تولد مشخص می شود. اما ممکن است پزشک معالج انجام سونوگرافی را جهت بررسی دیگر مشکلات مادرزادی که ممکن است وجود داشته باشد توصیه کند.

هیپوسپادياس چگونه درمان می شود؟

نوزادی که با هیپوسپادياس متولد می شود نباید ختنه شود و پوست اضافی این قسمت باید برای عمل جراحی ترمیمی که بعداً انجام می شود حفظ شود. در بسیاری از موارد پزشکان توصیه می کنند که عمل جراحی تا قبل از سن مدرسه انجام شود. ممکن است فرزند شما پس از عمل کمی خواب آلوده و کم اشتها باشد که در روز اول پس از عمل طبیعی است. آلت تناسلی فرزند شما ممکن است متورم و کبود باشد که به مرور و در عرض چند هفته برطرف می شود. بهبودی کامل ممکن است چند ماه زمان لازم داشته باشد.



بیمارستان خیریه قمر بنی‌هاشم (ع) نیشابور
۱۴ الی ۰۵۱۴۲۲۱۵۱۱

ناظر کیفی	دکتر سعید اکبری، متخصص اورولوژی
تهیه کنندگان	سارا شریفان (مسئول آموزش به بیمار) ثمینه عابدی (مسئول تغذیه ورژیم درمانی)
تاریخ بازنگری	۱۴۰۵

در صورت بروز علایم زیر به پزشک معالج مراجعه کنید:

- تب در هفته اول جراحی
- افزایش تورم، درد، ترشح، و یا خونریزی از محل عمل
- در صورت عدم ادرار کردن (پوشک کودک خشک است).



مراقبت های پس از ترخیص:

رژیم غذایی فرزندتان پس از ترخیص از بیمارستان معمولی خواهد بود.

فرزندتان مقدار کافی مایعات بنوشد تا ادرار کافی برقرار شود. در منزل زمانی که پزشک اجازه استحمام داد به آرامی و با صابون فرزند خود را بشویید از لیف یا کیسه کردن خودداری کنید. فرزند شما میتواند تمام فعالیت های قبلی را پس از بهبودی انجام دهد (به جز شنا کردن و بازی کردن در ماسه ها) پسرهای بزرگتر باید از ورزش عادی شدید مانند فوتبال، والیبال، دو چرخه سواری و ... برای ۳ هفته خودداری کنند.

