

## Strabismus



Esotropia

Normal

- در ساعات اولیه بعد از عمل ممکن است خونابه از چشم عمل شده به میزان کم، جاری شود که این موضوع نباید باعث نگرانی شما شود و مربوط به عمل جراحی است. با گاز استریل بدون فشار به چشم ترشحات خونابه را به آرامی پاک کنید.
- از مالش و دست زدن به چشم‌ها تا دو هفته خودداری کنید.
- در مورد شیرخواران و کودکان گاهی لازم است از محدود کننده‌ای مچ دست و ساعد استفاده کنید.
- حساسیت به نور در روزهای اول پس از عمل جراحی عادی است.

بهبودی این عمل سریع است. فرد اغلب ظرف چند روز به فعالیت‌های طبیعی‌اش برمی‌گردد. بعد از جراحی، گاهی استفاده از عینک یا منشور نیز ضرورت پیدا می‌کند. گاهی اوقات ممکن است اصلاح انجام‌شده بیشتر یا کمتر از مقدار مورد نظر باشد که در آن صورت انجام عملی دیگر ضرورت خواهد یافت.

- بعد از عمل جراحی استرابیسم اغلب نیاز به بستری شدن وجود ندارد.
- قرمزی، تورم، سوزش مختصر پس از عمل جراحی طبیعی است و به تدریج کاهش می‌یابد.
- به جز در موارد نادر بعد از عمل استرابیسم پانسمان چشم نیاز نمی‌باشد. ضمناً نیازی به استفاده از محافظ یا شیلد نیست.
- گاهی جراح داخل چشم‌ها را پس از عمل جراحی پر از پماد می‌کند، بلافاصله بعد از عمل وجود پماد را با چرک و عفونت اشتباه نکنید.



اداره کل اوقات و امور خیریه

بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم (ع)



## جراحی انحراف چشم

شروع جراحی استرابیسم با ایجاد برشی کوچک در بافت پوشاننده چشم است که به چشم‌پزشک امکان می‌دهد تا به عضلات زیرین این بافت دسترسی پیدا کند. اینکه کدام عضلات تحت عمل جراحی قرار گیرند بستگی به جهت چرخش چشم دارد. گاهی اوقات لازم است هر دو چشم تحت عمل جراحی قرار گیرد. جهت عمل جراحی استرابیسم در اطفال، بیهوشی ضرورت دارد ولی جراحی بزرگسالان گاهی با بی‌حسی موضعی نیز امکان‌پذیر است.



بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم (ع) نیشابور

۱۴ الی ۰۵۱۴۲۲۱۵۱۱

|               |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ناظر کیفی     | دکتر محمدرضا خوشرو، فوق تخصص شبکیه                                                   |
| تهیه کنندگان  | سارا شریفان<br>(مسئول آموزش به بیمار)،<br>ثمینه عابدی<br>(مسئول تغذیه و رژیم درمانی) |
| تاریخ بازنگری | ۱۴۰۵                                                                                 |

- در صورتی که قبل از عمل از عینک استفاده می کردید حتماً بعد از عمل در مورد استفاده از عینک از پزشک خود سؤال کنید.  
- ممکن است پس از عمل انحراف چشم جراح عینک های خاصی را به طور موقت ضروری بداند یا مدتی عینک شما را قطع کند یا شماره آن را تغییر دهد.



- دو بینی معمولاً در بزرگسالان بروز کرده اغلب گذرا است.  
- کودکان معمولاً در روز جراحی چشمان خود را باز نمی کنند که این مورد نگران کننده نیست.  
- زمان حمام کردن را حتماً از پزشک سؤال کنید. معمولاً اگر عمل جراحی با عارضه ای همراه نباشد تا سه روز به چشم آب و مواد شوینده نرسد، بعد از روز سوم می توان حمام کرد. بهتر است تا یک ماه جهت شستشوی سروصورت از شامپوی بچه استفاده شود.

- قطره های چشمی حدوداً تا یک هفته پس از عمل باید استفاده شود، در مورد قطره با پزشک مشورت کنید.  
- بخیه های چشم در عمل استرابیسم معمولاً نیازی به برداشتن ندارند و در عرض چند هفته خودبه خود جذب می شوند.  
- ممکن است پس از عمل جراحی، جراح تمرینات خاص حرکتی یا حسی و نیز بستن چشم را توصیه کند.

